

～ 多数ある抗体から「ウイルスの侵入を防ぐ中和抗体」をピンポイントに検出～

「ワクチン接種後の免疫をCHECKしたい方へ」

15分で調べる検査キット

中 和 抗 体 検 査


研究用



Check Station 応援アンバサダー 長友佑都選手

どんな検査キットですか？

▶ 新型コロナウイルスに対する中和抗体の有無を調べる検査キットです。



どんなタイミングで検査すれば良いですか？

▶ 2回目の接種から1週間程度後。半年程度後。1年程度後の検査を推奨されています。



中和抗体はワクチン接種後3カ月で25%にまで減少したというデータもあります。(国立国際医療研究センター調べ)

2回目のワクチン接種後、1週間ほどで中和抗体が生成され、まずはそのタイミングで定着確認のために検査し、その後も2～3カ月ごとに再度検査することにより、体内の中和抗体の有無を定期的にチェックすることが推奨されています。

中和抗体検査キットの特徴

信頼性

2億個以上
全世界での販売実績
※2021年3月時点

高精度

2段階方式を採用
「初めに出了血液を拭き取り、次に出た血液で検査」

オールインワン

必要備品がすべて揃っているから便利

簡単

自宅で15分でセルフ検査
その場で分かる

